




Viruela s mica o del mono (Monkeypox)

Descripci n

La viruela del mono es una enfermedad viral rara que se da principalmente en monos, simios y humanos. De la familia de los virus que causan la viruela.

Viruela de mono: caracter sticas.

- Orthopoxvirus del mismo g nero que la viruela
- Letalidad: 1-10%
- Per odo incubaci n promedio 1 a 13 d as
- La transmisi n inicia con la fiebre (no hay transmisi n asintom tica)
- Transmisi n animal a humano    contactado con fluidos corporales o mordedura.

Los poxvirus pueden sobrevivir durante mucho tiempo fuera del cuerpo, por lo que las superficies como las s banas y los pomos de las puertas son vectores potenciales de transmisi n.

Informaci n importante para prevenci n de contaminaci n.

Mecanismos de transmisi n humano a humano

- Contacto directo con lesiones en piel, costras o fluidos corporales, implica contacto cercano, puede haber transmisi n por mucosas (no s lo se trata de contactos sexuales)
- **Contacto indirecto:** por f mites, ropa o s banas contaminadas con fluidos corporales
- **Secreciones respiratorias:** requiere contacto por per odos prolongados, no es transmisi n aerobia ni por aerosoles
- **Transmisi n vertical:** el virus puede pasar de la madre al feto

  Qu  hacer en un caso sospechoso de viruela del mono?

1. Aislamiento y cohortización de pacientes
2. Uso EPP en todo contacto con el entorno del paciente: bata, guantes, monogafas, tapabocas N95
3. Aplique el lavado de manos en los 5 momentos indicados por la OMS
4. Realice al menos 2 desinfecciones rutinarias diarias y siempre una desinfección terminal al egreso del paciente
5. Utilice desinfectantes activos con actividad demostrada contra virus envueltos (coronavirus, influenza)
6. Evite sacudir, o agitar las prendas u objetos que hayan tenido contacto con el paciente o con fluidos del mismo
7. Siga el protocolo de manejo de residuos biológicos, procure el uso de elementos descartables que tengan contacto con fluidos corporales (riñoneras, patos, orinales)

¿Cómo debemos desinfectar las áreas y superficies? Validación del desinfectante

Dado que la viruela del simio es un virus envuelto, la eficacia antiviral potencial de una formulación desinfectante contra el virus de la viruela del simio debe demostrarse mediante pruebas contra el vaccinia virus.

Vaccinia es el sustituto del virus envuelto que se utiliza en las pruebas estándar EN14476 para evaluar la actividad virucida de los desinfectantes y antisépticos químicos contra los virus envueltos.

Al igual que el virus de la viruela del simio, el virus vaccinia es un virus envuelto del género Orthopoxvirus en la familia Poxviridae.

Desinfección rutinaria

- Realizar al menos 2 veces por día en caso de pacientes sospechosos o confirmados
- Superficies de Surfactan SH
- Dispositivos médicos de Septakan
- Superficies con carga orgánica de Alkazyme
- Pisos paredes y techos de AlkaDDS

Desinfección terminal

- Realizar al egreso del paciente
- **Remoción de carga orgánica:**
Aplicar Alkazyme sobre la superficie de trabajo, garantizando su distribución unidireccional y homogénea. Deje actuar por 5 minutos y retire.
- **Desinfección:**
Aplique Alkacide sobre la superficie, garantizando su distribución unidireccional y homogénea. Deje actuar por 15 minutos y retire con abundante agua.

Complemente la desinfección con tecnología de Luz UV-C

Efectividad comprobada contra vaccinia virus UNE 14476 en 5 minutos



[Septalkan® Spray Detergente Desinfectante de Equipos Biomédicos](#)

\$ 110.000

[Leer más](#)



[Surfalkan® SH Detergente Desinfectante de Superficies](#)

\$ 103.000

[Añadir al carrito](#)



[Alkacide® 1L Desinfectante de Alto Nivel](#)

\$ 903.000

[Añadir al carrito](#)



[Alkazyme® Spray Detergente Desinfectante Enzimático](#)

\$ 102.000

[Añadir al carrito](#)



[Alkazine® Detergente Desinfectante Enzimático](#)

\$ 99.000

[Añadir al carrito](#)

Efectividad comprobada contra vaccinia virus UNE 14476 en 15 minutos al 1%



AlkaDDS® Detergente Desinfectante de Áreas

Potente e inmediata acción de limpieza y desinfección, de áreas en menor tiempo. Transformando el ambiente con agradable olor a pomelo.

\$ 155.000

[Comprar ahora](#)

default watermark

Tecnologías avanzadas en control de infecciones

- Desinfección UV-C
- Se recomienda longitud de onda de 200-280 nm
- Disminuye exposición del personal
- Garantiza la eficacia biocida

Más que desinfección es proteger personas

Cuidado del paciente Sistema vernacare

- De preferencia utilice elementos no reutilizables que puedan tener contacto fluidos corporales y/o materia orgánica contaminada
- Disminuye la exposición relacionada con la atención en salud
- Dignifica el personal y el cuidado del paciente
- Responsable con el medio ambiente

Categoría

1. Desinfección Hospitalaria

Fecha de creación

7 de septiembre de 2022

Autor

webmaster

default watermark